

# SCOMPOSIZIONE DI POLINOMI

Nome: \_\_\_\_\_ data: \_\_\_\_\_

Scomporre un polinomio significa .....

Il grado di un monomio si calcola:.....

Il grado di un polinomio è:.....

Non sempre è possibile scomporre un polinomio (in tal caso il polinomio è detto .....

Non esiste un metodo unico per scomporre i polinomi: occorre fantasia, esperienza e... molti esercizi.

1) Raccoglimento a fattor comune:

a)  $6x^2y + 4xy^2 - 2x^2y^2 + 2xy =$

b)  $(x + y)^2 - 8y(x + y) + (x + y) =$

c)  $(2x - y) + 6x(y - 2x) =$

2) Raccoglimenti successivi a fattor comune:

d)  $3x^2 - 3xy^2 - x^3 + x^2y^2 - x^4 + x^3y^2 =$

3) Scomposizione mediante prodotti notevoli:

$$A^2 - B^2 =$$

$$A^2 + 2AB + B^2 =$$

$$A^2 + B^2 + C^2 + 2AB + 2AC + 2BC =$$

$$A^3 + 3A^2B + 3AB^2 + B^3 =$$

$$A^3 + B^3 =$$

$$A^3 - B^3 =$$

Talvolta si devono applicare più tecniche nello stesso esercizio:

e)  $9x^2 - 6x + 1 - y^2 =$

f)  $-x^3 - x^{11} + 2x^7 =$

4) Scomposizione di un trinomio notevole:  $x^2 + (a + b)x + ab = (x + a)(x + b)$

g)  $x^2 - 5x + 6 =$

5) Scomposizione con la regola di Ruffini:

in un polinomio a coefficienti interi, gli eventuali zeri razionali vanno cercati fra i numeri di tipo  $\pm p/q$ , dove  $p$  è un divisore intero del termine noto e  $q$  è un divisore intero del coefficiente del termine di grado massimo.

h)  $P(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$ . I divisori interi del termine noto sono:....., si verifichi quali tra questi costituiscono degli zeri per il polinomio:

$P(1) =$

$P(-1) =$

$P(2) =$

$P(-2) =$

Quindi il monomio è divisibile per ..... e .....

Si applica la regola di Ruffini per due volte:

il polinomio fattorizzato è:

